

Co je přípravek Nyxoid?

Přípravek Nyxoid je jednodávkový nosní sprej k urgentní léčbě předávkování opioidy (jako jsou heroin, methadon, fentanyl, oxykodon, buprenorfin a morfin). Každá krabička obsahuje dva nosní spreje (dvě jednotlivé dávky).

Přípravek Nyxoid nenahrazuje akutní lékařskou péči.

Přípravek Nyxoid by měl vždy s sebou nosit každý, kdo je vystaven riziku předávkování opioidy. Pečovatelé, jako jsou blízcí příbuzní nebo přátelé, by pro případ nouze měli vědět, kde sepřípravek Nyxoid nachází.

Kdy použít přípravek Nyxoid

Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k předávkování opioidy, podejte postižené osobě přípravek Nyxoid podle návodu uvedeném na zadní straně tohoto letáku.

VŽDY okamžitě volejte záchrannou službu, a to i když se pacient probudí – může znova upadnout do bezvědomí a přestat dýchat.

Dbejte opatrnosti: u osoby, které byl podán Nyxoid, se mohou objevit akutní abstinencní příznaky, které mohou být nebezpečné.

Pokud u sebe nosíte Nyxoid...

Nastavte si v kalendáři upozornění jeden měsíc před vypršením doby použitelnosti přípravku Nyxoid. Poté si zařidte výměnu za nový.

Jak přípravek Nyxoid funguje?


Přípravek Nyxoid obsahuje **naloxon**, který dočasně ruší účinky opioidů. Naloxon působí tak, že vytěsnuje molekuly opioidů z receptorů v mozku a těle.

Předávkování opioidy

Opioidy se vážou na receptoru.

→ Mozkové signály jsou blokovány. Dýchání se zpomaluje a dochází k jeho zá stavu. Postižená osoba ztrácí vědomí.

opiod



Léčba naloxonem

Naloxon se váže na receptoru pevněji. Dočasně vytěsnuje z vazby opioidy.

→ Mozkové signály se obnovují. Postižená osoba začíná dýchat a probouzí se.

Stručné pokyny

Podrobný návod naleznete na zadní straně tohoto letáku.

1 Zkontrolujte známky předávkování



2 Zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

3 Podejte přípravek Nyxoid



4 Uložte do stabilizované polohy



5 Sledujte a poskytněte péči dokud nepřijede záchranná služba

6 Podejte druhou dávku přípravku Nyxoid pokud po 2-3 minutách nepozorujete žádné zlepšení stavu pacienta nebo objeví-li se znova příznaky předávkování

7 Dbejte na svoji bezpečnost: dávejte pozor na výskyt akutních abstinencních příznaků

8 Zlikvidujte použitý sprej Nyxoid a zajistěte si nový

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárnici. Stejně postupujte i v případě, jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zasílání: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Mundipharma Corporation Limited

tel. +44 (0) 1223 424211

www.mundipharma.com

Nyxoid® je registrovaná ochranná známka společnosti Mundipharma Corporation Limited.

Verze: 1 Schváleno SÚKL: 03/2020

NYXOID®
naloxon



V tomto letáku se dozvíte:

- jak rozpoznat známky předávkování opioidy
- co dělat
- jak podat přípravek Nyxoid
- jak rozpoznat akutní abstinencní příznaky

Více informací naleznete na stránkách

www.nyxoid.com

nebo naskenujte kód QR

Stručný návod k použití
naleznete také na zadní straně
obalu přípravku Nyxoid.

Verze: 1



Schváleno SÚKL: 03/2020


Co dělat: krok za krokem

1 Zkontrolujte známky předávkování

- Opatrně přistupte.** Zjistěte, zda nehrází nebezpečí, jako jsou např. předměty pro injekční aplikaci, které by semohly nacházet v okolí.
- Zkontrolujte reakce osoby** ke zjištění, zda je při vědomí. Můžete:
 - zavolat její jméno
 - jemně jí zatrást rameny
 - hlasitě jí mluvit do ucha
 - třít její hrudní kost (sternum)
 - štípnout ji do ucha nebo nehtového lůžka
- Zkontrolujte dýchací cesty a dýchání**
 - odstraňte případné překážky v ústech a nosu
 - po dobu 10 sekund **kontrolujte dýchání** – pohybuje se hrudník? Slyšíte dýchání? Cítíte dech na tváři?
- Zkontrolujte známky předávkování**, například:
 - neodpovídá na dotek nebo zvuky
 - pomalé, nerovnoměrné dýchání nebo zástava dechu
 - chrápání, těžké dýchání nebo lapání po dechu
 - modré činárialové nehty nebo rty

2 Zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

Vždykamžitě volejte záchrannou službu, a to i když se pacient probudí.



Přípravek Nyxoid nenahrazuje akutní lékařskou péči ani základní oživovací opatření (jako je kardiopulmonální resuscitace).

- Je-li to možné, nastavte telefon do režimu hlasitý odposlech, čímž se vám uvolní ruce.
- Sdělte záchranné službě co nejvíce informací**, včetně toho:
 - kde se přesně nacházíte; dobré je znát ulici a číslo domu
 - jaké látky podle vás postižená osoba mohla požít
 - zda je postižená osoba při vědomí a dýchá
 - že máte v úmyslu podat nosní sprej Nyxoid

3 Podejte jednu dávku přípravku Nyxoid


Jeden sprej obsahuje pouze jednu dávku.



Odloupněte zadní stranu balení přípravku Nyxoid.
Vyměňte nosní sprej a položte jej tak, abyste na něj snadno dosáhl(a).



Položte pacienta na záda. Podepřete pacientovu šíji zezadu, abyste umožnil(a) záklon pacientovy hlavy. Odstraňte viditelné překážky, které blokují nos.



Držte nosní sprej tak, jak je uvedeno na obrázku – palcem na spodní straně pístu s ukazováčkem a prostředníčkem po obou stranách trysky.

! Předpoužití neprovádějte prostříknutí nosního spreje Nyxoid ani jej nezkoušejte.



Opatrně vsuňte trysku spreje do jedné nosní dírky. Podejte dávku pevným zatlačením na píst spreje, až uslyšíte cvaknutí. Vytáhněte trysku spreje z nosní dírky. Je-li to možné, poznamenejte, kterou nosní dírku jste použil(a).

4 Uložte pacienta do stabilizované polohy



A Horní končetinu, která je k vám blíže, položte tak, aby svírala pravý úhel s tělem a paže byla ohnuta.



B Druhou horní končetinu položte přes hrudník postiženého. Hřbet ruky postiženého mu položte na tvář.



C Uchopte vzdálenější dolní končetinu těsně nad kolennem. Koleno zvedněte. Přeplat postiženého směrem k sobě tak, aby ležel na boku.

Podložte postiženému hlavu tak, že mu ponecháte tvář položenou na hřbetu ruky.



D Konečná poloha: Ruka podpírá hlavu. Horní noha je ohnuta v kyčli a koleni.

5 Sledujte pacienta, dokud se nedostaví pomoc

- Zůstaňte s pacientem.** Pozorujte, zda se zlepšuje pacientovo dýchání a reakce na zvuky a dotyk.
- Je-li pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, poskytněte základní oživovací péče (jako je kardiopulmonální resuscitace), máte-li příslušné proškolení*.
- Budte pozorný (pozorná) – i pokud se pacient probere, může znova upadnout do bezvědomí a přestat dýchat.

6 Nedošlo k zlepšení? Podejte druhou dávku

- Pokud po 2–3 minutách nepozorujete žádné zlepšení stavu pacienta nebo objeví-li se znova příznaky předávkování: **podejte nový nosní sprej Nyxoid do druhé nosní dírky.** To lze provést, zatímco je pacient ve stabilizované poloze.

7 Dbejte na vlastní bezpečnost

- Přípravek Nyxoid může vyvolat akutní abstinenciční příznaky, pokud je pacient závislýna opioidech. K příznakům může patřit:
 - bolest těla a křeče
 - pocit na zvracení, zvracení, průjem
 - horečka, výtok z nosu nebo kýchání
 - pocení, třes nebo chvění
 - nervozita nebo podrážděnost

U některých pacientů může po probrání dojít k násilnému chování.

! Dbejte na vlastní bezpečnost.

8 Po příjezdu záchranné služby

- Okamžitě oznamte posádce, co se stalo a že jste podal(a) přípravek Nyxoid. Předejte posádce všechny použité nosní spreje Nyxoid.

Likvidace použitych nosních sprejů

Pokud zapomenete předat použité nosní spreje posádce záchranné služby, dejte je kvalifikovanému zdravotnímu pracovníkovi nebo lékárníkovi a zaříďte jejich výměnu za nové. **Nikdy** nevyhazujte spreje do odpadních vod nebo domácího odpadu.

* Více informací o školeních v základní neodkladné resuscitaci najeznete na stránkách České resuscitační rady <https://www.resuscitace.cz>