

Vad är Nyxoid®?

Nyxoid® är en nässpraymed en enstaka dos för akut användning efter en överdos av opioider (till exempel heroin, metadon, fentanyl, oxikodon, buprenorfin eller morfin). Varje förpackning innehåller 2 sprayer (2 enstaka doser).

Nyxoid® ersätter inte akut läkarvård.

Personer som löper risk för att överdosera opioider ska ha med sig Nyxoid®. Vårdare, till exempel familj eller vänner, ska veta var Nyxoid® finns i händelse av en akut situation.

När ska Nyxoid® användas

Om du vet eller misstänker att någon har tagit en överdos av en opioid ska du använda Nyxoid® på det sätt som beskrivs på andra sidan av detta blad.

! Ring ALLTID omedelbart efter en ambulans,

• även om personen vaknar –han/hon kan bli medvetslös igen och sluta andas.


! Var försiktig: en person som behandlas med Nyxoid® kan få akuta abstinenssymtom och kan bli aggressiv.

Om du har med dig Nyxoid®...

Notera i din kalender när det är 1 månad kvar tills bäst före-datumet på din Nyxoid®. Se sedan till att byta ut Nyxoid®-förpackningen mot en ny förpackning.

Hur fungerar Nyxoid®?

Nyxoid® innehåller **naloxon**, som tillfälligt upphäver effekten av opioider. Naloxon verkar genom att tränga undan opioidmolekyler från deras receptorer i hjärnan och kroppen.



Snabbguide

Fullständiga instruktioner finns på andra sidan av detta blad.

1 Kontrollera om det finns tecken på överdos

2 Ring efter ambulans



3 Ge Nyxoid®



4 Lagg personen i stabilt sidoläge



5 Övervaka och stötta tills ambulansen anländer (t.ex. hjärt-lungräddning)

6 Ge 2:a dosen Nyxoid® om ingen förbättring ses efter 2–3 minuter ELLER om symtom på överdos kommer tillbaka



7 Tänk på din egen säkerhet: var vaksam på akuta abstinenssymtom

8 Kassera använd Nyxoid® och få en ny förpackning

Mundipharma Corporation Limited
Nyxoid® är ett registrerat varumärke som tillhör Mundipharma Corporation Limited.

Mundipharma AB

Förberedelsedatum: maj 2024
Jobbkod: SciA-NYX-2400054



NYXOID®
naloxon



Denna broschyr beskriver:

- Hur du känner igen symtomen på en opioidöverdos
- Vad du ska göra
- Hur du ger Nyxoid
- Hur du känner igen akuta abstinenssymtom

För mer information

Besök www.nyxoid.com/se eller scanna QR-koden.

Det finns också en Snabbguide på baksidan av Nyxoid-blistertförpackningen.




Vad du ska göra: steg för steg

1 Kontrollera om det finns tecken på överdos

- **Närma dig personen försiktigt.** Kontrollera om det finns faror, till exempel injektionsmaterial bredvid personen
- **Kontrollera om personen reagerar**, för att se om personen är vid medvetande. Du kan:
 - ropa personens namn
 - skaka axlarna försiktigt
 - tala med hög röst i personens öra
 - gnugga bröstbenet (sternum)
 - nypa personens öra eller nagelbädd på ett finger
- **Kontrollera luftvägar och andning**
 - **Ta bort allt som eventuellt blockerar munnen och näsan**
 - Kontrollera andning i 10 sekunder – rör sig bröstkorgen? Kan du höra andningsljud? Kan du känna andetaget på kinden?
- **Kontrollera efter tecken på överdos, t.ex.:**
 - ingen reaktion på beröring eller ljud
 - långsam, ojämn andning eller ingen andning
 - personen snarkar, flämtar eller kippar efter andan
 - blå eller lila fingernaglar eller läppar

2 Ring efter ambulans


Ring alltid omedelbart 112, även om personen vaknar



! Nyxoid ersätter inte akut läkarvård eller första hjälpen (t.ex. hjärt-lungräddning).

- Sätt på högtalaren på din telefon, om du kan, för att ha händerna fria
- **Ge SOS-operatören så mycket information du kan, inklusive:**
 - din exakta position och adress (om du kan den)
 - vilka ämnen du tror personen kan ha tagit
 - om personen är vid medvetande och andas
 - att du planerar att ge Nyxoid®-spray


3 Ge 1:a dosen Nyxoid® Varje nässprayinnehåller endast en dos.



A
Dra av baksidan av Nyxoid®-blisterförpackningen. Ta ut nässprayen och placera den inom nära räckhåll.




B
Lägg personen på rygg. Stöd nacken och låt huvudet luta bakåt. Rensa bort allt du ser som kan blockera näsan.




C
Håll sprayen som på bilden – pekfinger och långfinger på var sin sida om pipen, tummen redo att trycka på kolven.

! Tryck inte för att testa innan du använder sprayen.



D
För försiktigt in spraypipen i ena näsborren. Tryck bestämt på kolven tills den klickar till för att ge dosen. Ta ut pipen ur näsborren. Anteckna om möjligt vilken näsborre du använde.

4 Lägg i stabilt sidoläge



5 Övervaka tills hjälp anländer

- **Stanna hos personen.** Se om du märker någon förbättring i andningen och personens respons på ljud och beröring
- Om personen är medvetslös och inte andas normalt ska du ge första hjälpen (t.ex. hjärt-lungräddning)
- Var vaksam – även om personen vaknar kan han/hon bli medvetslös igen och sluta andas

6 Ingen respons? Ge 2:a dosen

- Om det inte syns någon förbättring efter 2–3 minuter, eller om överdossymtom kommer tillbaka: använd en ny Nyxoid®-spray i den andra näsborren. Du kan göra det medan personen ligger i stabilt sidoläge

7 Tänk på din egen säkerhet

- Nyxoid® kan orsaka akuta abstinenssymptom om personen är beroende av opioider. Symtom kan omfatta:
 - värk i kroppen och kramper
 - kräkningar, illamående, diarré
 - feber, snuva eller nysningar
 - svettning, darrningar eller skakningar
 - ängslan eller irritabilitet

Vissapersoner kan bli aggressiva när de vaknar.

! Tänk på din egen säkerhet.

8 När ambulansen anländer

- **Berätta omedelbart vad som hänt och att du gett Nyxoid®. Ge dem all använd Nyxoid®-spray**

Kassering av använd nässpray

Om du glömmer att ge den använda sprayen till ambulanspersonalen ska du ge den till sjukvårds- eller apotekspersonal och se till att du får en ny förpackning. Spola aldrig ner spray i avloppet och kasta den aldrig i hushållssoporna.