

Qu'est-ce que Nyxoid® ?

Nyxoid® est un pulvérisateur nasal à dose unique destiné au traitement d'urgence d'un surdosage ou « overdose » aux opioïdes (comme l'héroïne, la méthadone, le fentanyl, l'oxycodone, la buprénorphine et la morphine). Chaque boîte contient **deux pulvérisateurs (2 doses uniques)**.

Nyxoid® ne remplace pas les soins médicaux d'urgence.

Toute personne à risque de surdosage aux opioïdes devrait toujours avoir Nyxoid® avec elle. Il est important que les aidants, comme la famille proche ou les amis, sachent où trouver Nyxoid® en cas d'urgence.

Quand utiliser Nyxoid® ?

Si vous savez ou suspectez que quelqu'un présente un surdosage aux opioïdes, utilisez Nyxoid® comme décrit au verso de ce feuillet.


- **Appelez TOUJOURS les secours d'urgence immédiatement**, même si la personne se réveille — elle peut de nouveau perdre connaissance et cesser de respirer
- **Mise en garde:** Une personne qui a reçu Nyxoid® peut présenter des symptômes de sevrage aigus. Prenez soin de votre propre sécurité.

Si vous emportez Nyxoid® avec vous, ...

définir un rappel dans votre calendrier 1 mois avant la date d'expiration, afin que vous puissiez vous occuper d'un pack de remplacement à temps.

Comment fonctionne Nyxoid® ?

Nyxoid® contient de la naloxone, qui annule temporairement les effets des opioïdes. La naloxone déplace les opioïdes des sites de liaison (récepteurs) correspondants dans le corps et le cerveau.



Référence rapide

Des instructions complètes sont fournies au verso de ce feuillet.

1 Vérifiez la présence de signes de surdosage

2 Appelez les secours médicaux (112)



3 Administrez Nyxoid®



4 Placez le patient en position latérale de sécurité



5 Surveillez le patient et supportez la personne jusqu'à l'arrivée des services de secours

6 Donnez la 2^{ème} dose de Nyxoid® en l'absence d'amélioration après 2-3 minutes OU de réapparition des symptômes de surdosage



7 Veillez à votre propre sécurité
Surveillez l'apparition de symptômes de sevrage aigu

8 Jetez le Nyxoid® usagé et assurez-vous de son remplacement

Notification des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également voir les effets secondaires directement sur www.guichet.lu/pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous pouvez contribuer à ce que davantage d'informations soient fournies sur l'innocuité de ce médicament.

Date de préparation : 02/2025

Référence : **SciA-NYX-2400051**

Nyxoid® est une marque déposée de Mundipharma Corporation Limited.
www.mundipharma.com

NYXOID®



NYXOID®

Naloxon spray nasale



Cette brochure vous montrera :

- Comment reconnaître les symptômes d'une surdose d'opioïdes
- Quoi faire
- Comment Nyxoid® est-il administré
- Comment reconnaître les symptômes de sevrage aigu

POUR plus d'informations

visitez le site www.nyxoid.com ou scannez le code QR.

Un guide d'initiation rapide est également imprimé au dos de l'emballage de Nyxoid®.




Quoi faire : étape par étape

1 Vérifiez la présence de signes de surdosage

- **Approchez avec prudence.** Vérifiez s'il y a des éléments dangereux, comme du matériel d'injection près du sujet.
- **Vérifiez la présence d'une réponse** afin de déterminer si la personne est consciente. Par exemple :
 - criez son nom
 - secouez doucement ses épaules
 - parlez fortement dans ses oreilles
 - frottez sa poitrine (son sternum)
 - pincez ses oreilles ou ses ongles.
- **Vérifiez les voies aériennes et la respiration.**
 - **Libérez la bouche et le nez** de toute obstruction.
 - Pendant 10 secondes, **vérifiez la respiration** — La poitrine bouge-t-elle ? Entendez-vous des bruits de respiration ?
Sentez-vous son souffle sur votre joue ?
- **Vérifiez la présence de signes de surdosage**, comme :
 - aucune réponse au toucher ou au bruit
 - respiration lente et irrégulière ou aucune respiration
 - ronflement, halètement ou déglutition
 - ongles ou lèvres bleus ou violets.

2 Appelez les secours médicaux (112)

Appelez toujours les services d'urgence immédiatement, même si la personne se réveille.



! Nyxoid® ne remplace pas les soins médicaux d'urgence.

- Si possible, allumez le haut-parleur de votre téléphone pour avoir les mains libres.
- **Fournir aux services d'urgence autant d'informations que possible, notamment:**
 - Votre position exacte et le code postal (s'il est connu),
 - Quelles substances pensez-vous que la personne a prises,
 - Si la personne est consciente et respire,
 - Que vous avez l'intention de donner à la personne le spray Nyxoid®.

3 Donnez 1 pulvérisation de Nyxoid®


Chaque pulvérisateur nasal contient une seule dose.



Enlevez la pellicule protectrice au dos de l'emballage de Nyxoid®. Retirez le pulvérisateur nasal et placez-le à portée de main.




Allongez la personne sur le dos. Soutenez sa nuque et inclinez sa tête en arrière. Libérez le nez de toute obstruction visible.



Tenez le pulvérisateur comme indiqué — deux doigts de part et d'autre de l'embout, le pouce prêt à appuyer sur le piston.

! **N'appuyez pas pour amorcer ou tester Nyxoid® avant de l'utiliser.**



Insérez doucement l'embout du dispositif dans une narine. Appuyez fermement sur le piston jusqu'au clic pour administrer la dose. Retirez l'embout de la narine. Si possible, notez quelle narine a été utilisée.

4 Placez la personne en position latérale de sécurité



Tendez la tête (doucement) vers l'arrière. Soutenez la tête en laissant la main de la personne sur la joue.



Jambe supérieure pliée au niveau de la hanche et du genou

5 Surveillez-le jusqu'à l'arrivée des secours

- **Restez avec la personne.** Soyez attentif à une amélioration de la respiration et de la réaction au bruit et au toucher
 - Si la personne est inconsciente et ne respire pas normalement, si vous êtes formé à cela, commencez des mesures de réanimation (comme le massage cardio-pulmonaire).
 - Pour plus d'informations sur les mesures de réanimation, vous pouvez contacter à l'avance la Croix-Rouge Luxembourgeoise, par exemple.
- ! **Soyez vigilant(e) — même si la personne se réveille, elle peut de nouveau perdre connaissance et cesser de respirer**

6 Pas de réponse ? Donnez la 2^{ème} dose

- Si l'état du patient ne s'améliore pas **dans les 2 à 3 minutes**, ou si les symptômes de surdosage réapparaissent : **utilisez le 2^{ème} pulvérisateur de Nyxoid® dans l'autre narine.** Cela peut être réalisé alors que la personne est en position latérale de sécurité.

7 Veillez à votre propre sécurité

- Nyxoid® peut entraîner des **symptômes de sevrage aigu** si la personne est dépendante aux opioïdes. Les symptômes peuvent inclure :
 - courbatures et crampes
 - vomissements, nausées, diarrhée
 - fièvre, écoulement nasal ou éternuement
 - transpiration, frissons ou tremblements
 - nervosité ou irritabilité.

Certaines personnes peuvent faire preuve d'agressivité lors de leur réveil.

! **Prenez soin de votre propre sécurité.**

8 À l'arrivée des secours

Informez immédiatement l'équipe de secours de ce qui s'est passé et du fait que vous avez donné Nyxoid®. Donnez-leur tout pulvérisateur de Nyxoid® ayant été utilisé.

Élimination des pulvérisateurs nasaux usagés

Si vous oubliez de donner les pulvérisateurs à l'équipe de secours, remettez-les à un professionnel de santé ou pharmacien et faites en sorte qu'ils soient remplacés. Ne jetez jamais les pulvérisateurs dans les égouts ou avec les déchets ménagers.